

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโลกสำโรง	ฉบับที่: 4
ระเบียบปฏิบัติการเลขที่: พท - PC1-02-๖๐/๐4	หน้า:3
เรื่อง:แนวทางปฏิบัติการดูแลเช็ดตาและสะดือ	วันที่: ๒๐ มิถุนายน ๖๕
แผนก:งานสูติกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง:ห้องคลอด,ตึกปชร.บน,ห้องพิเศษ
ผู้จัดทำ:พยาบาลห้องคลอด	ผู้ทบทวน: <i>NS</i> ผู้อนุมัติ: <i>W me</i>

วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
- 2.เพื่อให้ทารกแรกเกิดได้รับการดูแลเช็ดตาและสะดือที่ถูกต้องอย่างมีมาตรฐาน
- 3.เพื่อลดการเกิดภาวะOmphalitisในทารกแรกเกิด

นโยบาย

ทารกแรกเกิดต้องได้รับการดูแลเช็ดตาและสะดือที่ถูกต้องอย่างมีมาตรฐานจากพยาบาลวิชาชีพเป็นแนวทางเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบ


- 1.สูติแพทย์,แพทย์เวร
 - ตรวจตาและสะดือทารกแรกเกิดทุกวัน
 - บันทึกสิ่งที่ตรวจพบ
 - ดูแลรักษาการพยาบาล
- 2.พยาบาลวิชาชีพ
 - ดูแลเช็ดตาและสะดือตามแนวทางปฏิบัติการดูแลเช็ดตาและสะดือ

แนวทางปฏิบัติ

การดูแลเช็ดสะดือทารกแรกเกิดดูแลเช็ดสะดือทารกแรกเกิดวันละ 2 ครั้ง เข้าประมาณ 06.00 น. หลังซั้ง น้ำหนักเด็ก และบ่ายประมาณ 13.00 น. หลังการนอนอาบน้ำเด็กทุกครั้ง และทารกหลังคลอดภายใน 6 ชั่วโมงขึ้นไปต้องเช็ดตาและสะดือด้วย(ห้องพิเศษปรับเวลาตามทีแต่ละตึกกำหนด)

ปฏิบัติดังนี้

- 1.เตรียมสถานที่สะอาด
- 2.เตรียม Set เช็ดสะดือให้พร้อม Setเช็ดสะดือประกอบด้วย
 - ถ้วยสำหรับใส่NSS มีสำลี 6 ก้อน และ Cotton bud 2 อัน
 - ถ้วยสำหรับใส่1%Providine Solution มีสำลี 4 ก้อน และ Cotton bud 2 อัน
- 3.ล้างมือให้สะอาด
- 4.ขั้นตอนการเช็ดตา-เช็ดสะดือ

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโลกสำโรง	ฉบับที่:
ระเบียบปฏิบัติการเลขที่:	หน้า:3
เรื่อง:แนวทางปฏิบัติการดูแลเช็ดตาและสะดือ	วันที่:
แผนก:งานสูติกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง:ห้องคลอด,ตึกปชร.บน,ห้องพิเศษ
ผู้จัดทำ:พยาบาลห้องคลอด	ผู้ทบทวน:  ผู้อนุมัติ: 


- ห้ามญาตินั่งหรือนอนบนเตียงของผู้ป่วยซึ่งทางแผนกได้จัดเตรียมที่นั่งสำหรับญาติ
 - ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 12 ปี และญาติที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินหายใจเข้าเยี่ยม
 - ห้ามตากผ้าบริเวณหัวเตียงและท้ายเตียงหรือราวกันเตียง ทางแผนกได้เตรียมราวตากผ้าไว้ให้
 - ให้มารดาระวังสิ่งจับถ้ายาทกรปนเปื้อนสะดือและห้ามโรยแป้งบริเวณสะดือทารกรวมทั้งเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับทารกควรทำความสะอาดก่อนนำมาใช้กับทารกทุกครั้งและห้ามใช้ปนกับมารดาหรือคนอื่น
 - ห้ามนำทารกของตนเองไปดูคนมของคนอื่น
 - ห้ามบุคคลที่แพ้ดิดเชื้อเข้าเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
- 3.จัดทำป้ายโปสเตอร์เพื่อเน้นย้ำให้มารดาและญาติให้เห็นความสำคัญของการล้างมือติดบริเวณห้องพักหลังคลอดให้ทุกคนเห็นชัดเจนข้อความว่า “ล้างมือ ก่อน-หลัง สัมผัสทารกทุกครั้ง”
- 4.จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลไว้ท้ายเตียงทุกเตียงและเปลี่ยนขวดแอลกอฮอล์เจลทุก 7 วัน
5. ทำความสะอาดหัวเตียง,เหล็กกันเตียง ทุกวัน
- 6.ดูแลกำกับนิเทศการทำความสะอาดตามZoningของพนักงานทำความสะอาด
- 7.เปลี่ยนพรมเช็ดเท้า หน้าห้องน้ำเข้า-กลางวัน-เย็น
- 8.จัดทำแผ่นพับการเช็ดตา เช็ดสะดือทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัดคุณภาพ

- 1.ทารกได้รับการดูแลเช็ดตาและสะดือได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ
- 2.อัตราการเกิด Omphalitis เท่ากับ 0%(ในทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ30วัน)

เกณฑ์การวินิจฉัย Omphalitis (ในทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ30วัน)

- บริเวณสะดือมีผื่นแดงและ/หรือมีน้ำเหลืองหรือหนองไหลออกมาจากสะดือและอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้
- เพาะเชื้อก่อโรคค้จากน้ำเหลืองหรือหนองที่ไหลออกมาที่เก็บ โดยวิธี Aseptic Technique
 - เพาะเชื้อได้จากเลือด

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโลกสำโรง	ฉบับที่:
ระเบียบปฏิบัติการเลขที่:	หน้า:3
เรื่อง:แนวทางปฏิบัติการดูแลเช็ดตาและสะดือ	วันที่:
แผนก:งานสูติกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง:ห้องคลอด,ตึกปชร.บน,ห้องพิเศษ
ผู้จัดทำ:พยาบาลห้องคลอด	ผู้ทบทวน:  ผู้อนุมัติ: 

- ห้ามญาตินั่งหรือนอนบนเตียงของผู้ป่วยซึ่งทางแผนกได้จัดเตรียมที่นั่งสำหรับญาติ
 - ไม่นุญาตให้เด็กต่ำกว่า 12 ปี และญาติที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินหายใจเข้าเยี่ยม
 - ห้ามตากผ้าบริเวณหัวเตียงและท้ายเตียงหรือราวกันเตียง ทางแผนกได้เตรียมราวตากผ้าไว้ให้
 - ให้มารดาระวังสิ่งขับถ่ายทารกปนเปื้อนสะดือและห้ามโรยแป้งบริเวณสะดือทารกรวมทั้งเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับทารกควรทำความสะอาดก่อนนำมาใช้กับทารกทุกครั้งและห้ามใช้ปนกับมารดาหรือคนอื่น
 - ห้ามนำทารกของตนเองไปดูคนมของคนอื่น
 - ห้ามบุคคลที่แพ้ติดเชื้อเข้าเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
3. จัดทำป้ายโปสเตอร์เพื่อเน้นย้ำให้มารดาและญาติให้เห็นความสำคัญของการล้างมือติดบริเวณห้องพักหลังคลอดให้ทุกคนเห็นชัดเจนข้อความว่า “ล้างมือ ก่อน-หลัง สัมผัสทารกทุกครั้ง”
4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลไว้ท้ายเตียงทุกเตียงและเปลี่ยนขวดแอลกอฮอล์เจลทุก 7 วัน
5. ทำความสะอาดหัวเตียง, เหล็กกันเตียง ทุกวัน
6. ดูแลกำกับนิเทศการทำความสะอาดตาม Zoning ของพนักงานทำความสะอาด
7. เปลี่ยนพรมเช็ดเท้า หน้าห้องน้ำเข้า-กลางวัน-เย็น
8. จัดทำแผ่นพับการเช็ดตา เช็ดสะดือทารกแรกเกิด

ตัวชี้วัดคุณภาพ

1. ทารกได้รับการดูแลเช็ดตาและสะดือได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ
2. อัตราการเกิด Omphalitis เท่ากับ 0% (ในทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน)

เกณฑ์การวินิจฉัย Omphalitis (ในทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน)

- บริเวณสะดือมีผื่นแดงและ/หรือมีน้ำเหลืองหรือหนองไหลออกมาจากสะดือและอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้
- เพาะเชื้อก่อโรคจากรูน้ำเหลืองหรือหนองที่ไหลออกมาที่เก็บ โดยวิธี Aseptic Technique
 - เพาะเชื้อได้จากเลือด